

**АНКЕТА
донора ГУЗ «ЛОСПК»****сбор эпидемиологического анамнеза по НКВИ (COVID-19)**

ФИО _____

Я подтверждаю, что получил(а) инструктаж о правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГУЗ «ЛОСПК» - о том, что необходимо измерить температуру тела при входе, одеть СИЗ (маску) закрыв ей нос и рот, обработать руки при входе кожным антисептиком; я предупрежден(а) об административной ответственности за нарушение указанных правил по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Я подтверждаю, что за последние 14 дней:

1. не выезжал(а) за пределы Липецкой области и не посещал (а) зарубежные страны и территории России с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19): г. Москва, Московская область, г. С-Петербург и др.
2. не был(а) в тесном контакте с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной НКВИ (COVID-19), которые в последующем заболели
3. не имел(а) тесные контакты с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз НКВИ (COVID-19)
4. не был(а) госпитализирована в медицинские организации Липецкой области и (или) других регионов.

дата _____ 20__ г.

подпись _____

Приказа МЗ РФ от 20.10.2020г № 1129н «Об утверждении правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

МР 3.1.5.0076/1-13 «До - и послетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ»

ФИО _____

(дата, месяц, год рождения; адрес места жительства; гражданство)

ДОТЕСТОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ВИЧ-инфекция - инфекционное хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

- ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: при сексуальных контактах без презерватива; через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. Часто заражение происходит при совместном использовании несколькими людьми одного инструментария для употребления наркотиков (любого предмета или приспособления, на который попадает кровь); возможно заражение при применении готовых растворов наркотиков, в который могли занести ВИЧ раньше; от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

Заражение ВИЧ при бытовых контактах: при рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, совместном приеме пищи, а также при укусах насекомых не происходит.

Как избежать заражения ВИЧ. В течение жизни, человек может использовать разные способы предохранения: иметь только одного верного, не инфицированного ВИЧ полового партнера, не употреблять наркотики или всегда пользоваться презервативами. Для предотвращения заражения через кровь необходимо избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека.

Своевременное установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований позволяет вовремя начать необходимое лечение и принять другие меры к уменьшению негативных последствий заражения ВИЧ, например, предотвратить передачу ВИЧ близким людям.

Дополнительную информацию по профилактике ВИЧ – инфекции, психологической помощи можно получить в ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135, телефон 34-12-19.

« ____ » _____ 202_ г.

(подпись донора)_____
(ФИО врача ГУЗ «ЛОСПК»)_____
(подпись врача)