

## Анкета донора ГУЗ «ЛОСПК» сбор эпидемиологического анамнеза по НКВИ COVID-19

ФИО \_\_\_\_\_

Я подтверждаю, что получил(а) инструктаж о правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУЗ «ЛОСПК» – о том, что необходимо измерить температуру тела при входе, одеть СИЗ (маску) закрыв ей нос и рот, обработать руки при входе кожным антисептиком; я предупрежден(а) об административной ответственности за нарушение указанных правил.

Я подтверждаю, что за последние 7 календарных дней:

1. Не выезжал(а) за пределы Липецкой области и не посещал(а) зарубежные страны и территории России с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19: г. Москва, Московская область, г. С-Петербург и др.
2. Не был(а) в контакте с лицами, находящимися под наблюдением / на карантине / на самоизоляции по инфекции, вызванной НКВИ COVID-19.
3. Не имел(а) контакты с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз НКВИ COVID-19.
4. Не был(а) госпитализирован(а) в медицинские организации Липецкой области и (или) других регионов.

Дата \_\_\_\_\_ 2023 г.

Подпись \_\_\_\_\_

Приказа МЗ РФ от 20.10.2020 г. № 1129н «Об утверждении правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  
МР 3.1.5.0076/1-13 «До - и послетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ»

ФИО \_\_\_\_\_

(дата, месяц, год рождения; адрес места жительства; гражданство)

### ДОТЕСТОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ВИЧ-инфекция – инфекционное хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению, вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: при половых контактах без презерватива; через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. Часто заражение происходит при совместном использовании несколькими людьми одного инструментария для употребления наркотиков (любого предмета или приспособления, на который попадает кровь); возможно заражение при применении готовых растворов наркотиков, в который могли занести ВИЧ раньше; от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

Заражение ВИЧ при бытовых контактах: при рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, совместном приеме пищи, а также при укусах насекомых не происходит.

Как избежать заражения ВИЧ. В течение жизни, человек может использовать разные способы предохранения: иметь только одного верного, не инфицированного ВИЧ полового партнера, не употреблять наркотики или всегда пользоваться презервативами. Для предотвращения заражения через кровь необходимо избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека.

Своевременное установление диагноза ВИЧ-инфекции на основании обнаружения антител и данных последующих исследований позволяет вовремя начать необходимое лечение и принять другие меры к уменьшению негативных последствий заражения ВИЧ, например, предотвратить передачу ВИЧ близким людям.

Дополнительную информацию по профилактике ВИЧ-инфекции, психологической помощи можно получить в ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135, телефон 34-12-19.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись донора)

\_\_\_\_\_  
(ФИО врача ГУЗ «ЛОСПК»)

\_\_\_\_\_  
(подпись врача)